



## Postříkový selektivní herbicidní přípravek ve formě suspenzní emulze pro preemergentní a časně postemergentní ošetření kukuřice proti jednoletým trávám a dvouděložným plevelům

### Účinné látky

S-metolachlor 500 g/l  
mesotrione 60 g/l

### Balení

5 l HDPE kanystr

### Výhody použití

- originální přípravek s prověřenými účinnými látkami
- bez omezení na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám
- vysoká a dlouhodobá účinnost proti širokému spektru plevelů v kukuřici
- vhodný do antirezistentních programů
- účinek přes půdu i přes listy
- výborný partner do TM kombinací s herbicidy do kukuřice

### Působení přípravku

Camix je herbicidní přípravek určený k základnímu preemergentnímu i časně postemergentnímu ošetření kukuřice. Účinná látka mesotrione patří do skupiny triketonů. Mechanismus účinnosti je založen na inhibici p-hydroxyphenyl pyruvate dioxygenasy, která zasahuje do metabolismu biosyntézy karotenoidů v buňkách citlivých plevelů. Příjem probíhá přes listy i kořeny. V rostlinách se šíří akropetálně i bazipetálně. Účinek se projevuje zbělením listů a nekrózami vrcholových pletiv u zasažených plevelů. Účinná látka S-metolachlor patří do chemické skupiny chloroacetanilidů. Z půdy je převážně přijímána přes kořenový krček a klíčky vzcházejících plevelů. Menší množství účinné látky přijímají plevely prostřednictvím kořenů, ale tento způsob příjmu je pomalejší než přes klíčky. Mechanismu účinnosti je založen na zabránění vzniku mastných kyselin s velmi dlouhým řetězcem v buňkách citlivých rostlin.

### Spektrum herbicidní účinnosti:

Camix hubí spolehlivě následující druhy plevelů:

### Jednoděložné plevely

Ježatka kuři noha, proso seté.

### Dvouděložné plevely

Laskavec srstnatý, merlík bílý, lebedy, rdesno ptačí, rdesno červivec, rdesno blešník, violky, heřmánkovec přímořský, penízek rolní, rozrazil perský, hluchavky, výdrol slunečnice, zemědým lékařský, konopice rolní, svízel přítula, ředkev ohnice, lilek černý, ptačinec žabinec, kokoška pastuší tobolka, durman obecný, hořčice rolní, pětouť maloúborný a další. Středně citlivá je pohanka svlačcovitá a při cpost aplikaci proso seté.

### Odolné plevely

Pýr plazivý, ostatní vytrvalé plevely.

### Pokyny pro aplikaci

Camix je povolen v dávce 2,5 l/ha pro preemergentní a časně postemergentní ošetření kukuřice, kdy je možné přípravek aplikovat samostatně ve fázi od děložních listů



Camix 2,5 l/ha + Spray Aide

#### Návod k použití, dávkování

Dávka vody 200–600 l/ha

Plodina	Plevele	Dávka/ha	OL	Poznámka
Kukuřice	Ježatka kuří noha, proso seté, jednoleté dvouděložné plevele	2,5 l	AT	PRE
	Ježatka kuří noha, proso seté, citlivé jednoděložné plevele a pozemky vysoce zaplevelené merlíky, laskavci, pohankou svačcovitou	1,5 l + 1,5 l	AT	PRE Aspect Pro
	Ježatka kuří noha (1–2 listy), jednoleté dvouděložné plevele (2–4 listů), durman, výdrol slunečnice, pcháč (10–15 cm)	2,5 l	AT	CPOST
	Ježatka kuří noha (1–3 listy), jednoleté dvouděložné plevele (2–8 listů), pohanka svačcovitá, durman, výdrol slunečnice, pcháč (10–15 cm)	1,5 l + 1,5 l	AT	CPOST Aspect Pro
Kukuřice	Ježatka kuří noha, bery (2 listy - začátek odnožování), jednoleté dvouděložné plevele včetně opletky obecné (4–6 pravé listy), pcháč oset, svačec (přízemní růžice)	1,5 l + 0,25 kg + 0,08 l	AT	CPOST Laudon + Spray Aide

OL = ochranná lhůta (dny), AT je dána technologickým termínem ošetření

do 2 listů kukuřice (BBCH 10–12) a v době, kdy citlivé dvouděložné plevele dosahují růstové fáze do 4. pravého listu (BBCH 14), ježatka kuří noha v růstové fázi maximálně do dvou listů. Pro rozšíření spektra účinnosti a zajištění účinku ve vyšších růstových fázích plevelů je možné používat přípravek Camix spolu s herbicidem Aspect Pro.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost.

Pokud se očekává déšť do 3 hodin, nebo za suchého počasí s vysokými teplotami, kdy hrozí zasychání aplikacní kapaliny na povrchu rostlin nebo hrozí-li nebezpečí úletu, doporučujeme do postřiku přidat multifunkční pomocnou lát-

ku Agrovital v koncentraci 0,07% (0,2 l/ha v 300 l/ha vody).

**Pěstování kukuřice na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.**

**Camix je vhodný pro použití v systému pěstování kukuřice na svažitých pozemcích v blíz-**

**kosti povrchových vod.** Přípravky na bázi účinné látky terbutylazin (Balaton Plus, Boltox TX, Koban Top, Successor TX, Sulcotrek, Akris a Aspect Pro), thiencarbazone (Adengo, Maister power), rimsulfuron (Arigo 51 WG), nicosulfuron (Milagro, Nishin, Nicogan, Loop a další) nelze používat na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Naopak přípravek Camix toto omezení nemá, a proto je vhodnou alternativou na plochy kukuřice, které byly osety na těchto plochách.

#### Následné plodiny

V rámci normálního osevního postupu je možné pěstování těchto následných plodin za dodržení následujících podmínek.

- v případě obilnin a travních porostů je pěstování možné po mělkém zpracování půdy.

- před výsevem řepky olejky a slunečnice se musí pozemek zorat nebo hloubkově zpracovat.
- jsou-li následnou plodinou luskoviny, může dojít za nepříznivých podmínek (půda s nízkou biologickou aktivitou, nízkým pH, špatnou půdní strukturou, při dlouhodobě trvajícímu zimnímu i letnímu suchu a stresových podmínkách) k mírnému prosvětlení listů zrnového hrachu a nebo bobu. Ojediněle bylo také pozorováno zbrzdění růstu a prořídnutí porostu.
- v následném roce po aplikaci nelze pěstovat řepu, jeteloviny nebo zeleniny (včetně dýně).

#### Náhradní plodiny

Po předčasné likvidaci kultury lze dle dosavadních zkušeností osít kukuřici jako náhradní plodinu. Nedostatečné vypláchnutí aplikáčního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

#### Mísitelnost a lepší kompatibilita

Přípravek je mísitelný s DAM 390 a s přípravky na bázi glyphosátu. Pro lepší kompatibilitu v TM nebo lepší účinnost herbicidů doporučujeme použít SPRAY AIDE v dávce 50 ml/100 l postřikové kapaliny. Pro rozšíření spektra účinnosti a zajištění účinku ve vyšších růstových fázích plevelů může být Camix kombinován s přípravkem Aspect Pro, Laudon nebo Laudis.

#### Upozornění


Přípravek nedoporučujeme aplikovat na porost poškozený škůdci nebo oslabený nepříznivými povětrnostními podmínkami (např. mráz, kroupy či období chladu) a podmáčením.



Camix je vhodný pro použití v systému pěstování kukuřice na svažitých pozemcích v blízkosti povrchových vod

## Aspect Pro + Camix

Dávka 1,5 l/ha + 1,5 l/ha - časně postemergentní aplikace



Ježatka 1–3 listy, dvouděložné plevely 2–8 (10) listů, durman, výdrol slunečnice, pcháč

Účinnost časně postemergentní aplikace Aspect Pro + Camix ve srovnání se standardními herbicidy (Zdroj ČZU 2023)

