



KANEMITE

Postřikový akaricidní přípravek ve formě dispenzního koncentrátu k ochraně chmele otáčivého proti svilušce chmelové.

Účinná látka

acequinocyl 150 g/l

Balení

5 l COEX kanystř

Výhody použití

- originální přípravek s novou účinnou látkou
- vhodný do antirezistentních programů
- moderní tekutá formulace
- není toxický pro nečlivoé organismy na chmelu
- účinný i při vyšších teplotách

Působení přípravku

Akaricid Kanemite 15 SC působí kontaktně proti všem stádiím svilušky chmelové včetně vajíček. Mechanismus účinku je založen na schopnosti účinné látky acequinocyl inhibovat transport elektronů v mitochondriích škůdce a blokuje tím buněčné dýchání. Se zvyšující se teplotou v době aplikace, nedochází ke snížení účinnosti přípravku.

Spektrum účinnosti

Hlavním cílem účinnosti přípravku jsou všechny stádia svilušky chmelové na chmelu otáčivém.

Pokyny pro aplikaci

V chmelu otáčivém se přípravek používá proti všem stádiím svilušky chmelové podle signalizace nebo preventivně v období od fáze kdy rostlina dosáhly výšky 1/4 drátu do fáze polovičního vývoje hlávek (BBA 38–75).

Prakticky lze Kanemite 15 SC používat proti všem stádiím svilušky během celého vegetačního období s přihlédnutím na ochrannou

lhůtu. Přípravek lze doporučit jak pro 1. postřik (v případě, že nebyl použit ovcidní akaricid před květem) nebo pro 2. postřik v nejkritičtější období výskytu svilušky od poloviny až do konce července. Přípravek má dlouhý reziduální účinek (30 dní) a plně ochrání porost až do sklizně. Doporučená dávka vody by měla odpovídat termínu aplikace (při dodržení koncentrace 0,15 %), tj. od 1000 l/ha (1,5 l/ha přípravku) v průběhu června do 2000 l/ha (3,0 l/ha přípravku) v průběhu července. Použité množství vody je nutné vždy přizpůsobit růstové fázi a výšce chmele v době aplikace. Kanemite 15 SC je kontaktní přípravek. Pro zajištění požadované účinnosti dbejte na dostatečnou dávku postřikové kapaliny. Na podporu, prodloužení účinnosti a zvýšení ochrany kontaktní složky přípravku proti smyvu deštěm používejte v kombinaci s 0,05 % Agrovitalu.

Chmel ošetřený Kanemite 15 SC nemá vývozní omezení, má stanoveny importní tolerance pro všechny rozhodující vývozní státy (USA, Německo, Japonsko).

Mísitelnost

Přípravek je mísitelný s běžnými fungicidy a insekticidy používanými ve chmelu. Fyzikální kompatibilitu s kapalnými hnojivy proveďte.



Návod k použití, dávkování

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka přípravku	Dávka vody	OL	Poznámka
Chmel otáčivý	Sviluška chmelová	0,15% (1,5-3,0 l/ha)	1000-2000 l/ha	21	Max. 1x

OL = ochranná lhůta dny