



Herbicidní ošetření řepky olejky s využitím přípravku Successor 600

Rudolf Malina; AgroProtec s.r.o.

Založení porostů řepky olejky vyžaduje precizní zvládnutí herbicidní ochrany již v počátečních fázích vegetace. Regulace zaplevelení je klíčovým faktorem ovlivňujícím konkurenceschopnost plodiny, dostupnost živin i konečný výnos.

S ohledem na omezení používání glyfosátu v předsklízňových aplikacích narůstá význam účinného herbicidního ošetření v podzimním období. Důraz je kladen především na preemergentní a časné postemergentní zásahy.

Společnost AgroProtec nabízí řešení založené na přípravku Successor 600 (účinná látka pethoxamid), který je určen zejména pro regulaci jednoletých trav a dvouděložných plevelů v porostech řepky olejky.

Successor 600

Postřikový herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu určený proti jednoletým travám a dvouděložným plevelům v řepce olejce.

Hlavní výhody:

- originální přípravek s úč. l. pethoxamid,
- vhodný do antirezistentních programů,
- účinek přes půdu i list,
- výborný ekotoxikologický profil,
- bez omezení v OP II. st.,
- vhodný do tank-mixů (se smáčecím efektem),
- použitelný v širokém spektru plodin,
- mísitelný s DAM 390,
- při zaorání řepky lze bez omezení vysévat následné ozimé obilniny.

Účinná látka pethoxamid patří do skupiny chlo-racetamidů. Je přijímána především přes kořeny, hypokotyl a listy plevelů. Působí částečně systémově a inhibuje syntézu lipidů.

Nejvyšší citlivost plevelů je ve fázi děložních listů. Reziduální účinek proti později vzcházejícím plevelům trvá několik týdnů po aplikaci. Podmínkou dobré účinnosti je dostatečná půdní vlhkost a kvalitně připravený, drobtovitý půdní povrch. Při aplikaci na suchou půdu nastupuje účinek až po následných srážkách.

Termín aplikace

V řepce olejce se přípravek používá PRE (před vzejitím) nebo CPOST do fáze 4.–6. listu (BBCH 00–16)

Cenově výhodné balíčky pro komplexní odplevelení řepky

Successor 600 + Commpas CS

- Balení: 4x5 l + 2x1 l (na 10–13 ha)
- dávkování 1,5–2,0 + 0,15–0,2 l/ha,
 - složení pethoxamid 600 g/l + clomazon 360 g/l,
 - osvědčená preemergentní kombinace,
 - řeší hlavní plevelné spektrum - heřmánkovité, rozrazil, hluchavky, svízel, brukvovité aj.,
 - vhodné do antirezistentních programů,
 - bez omezení následných plodin,
 - bez omezení v OP II. st. podzemní vody.

Successor 600 + Command 36 CS

- Balení: 4 x 5 l + 1x2 l (na 10–13 ha)
- dávkování 1,5–2,0 + 0,15–0,2 l/ha,
 - prověřená herbicidní kombinace,

- široké spektrum účinku,
- vhodná do antirezistentních strategií,
- bez omezení následných plodin,
- bez omezení v OP II. st. podzemní i povrchové vody.

Využití Successoru 600 při CPOST a POST aplikaci

Herbicid Successor 600 lze velmi dobře využít i v postemergentních systémech, kde se doplňuje např. s přípravky Galera Podzim a Belkar. Tyto kombinace zajišťují komplexní odplevelení při vysoké selektivitě k řepce a příznivých nákladech.

Doporučené tank-mixy:

- Successor 600 + Galera Podzim (1,75–2,0 + 0,2 l/ha),
- Successor 600 + Belkar (1,75–2,0 + 0,25 l/ha).

Dělené aplikace (běžné zaplevelení):

- PRE / CPOST - Successor 600 (1,75–2,0 l/ha) lze aplikovat společně s insekticidem nebo graminicidem (např. Granat + Spray Aide),
- následně POST - Galera Podzim (0,2 l/ha) nebo Belkar (0,25 l/ha).

Tento systém je vhodný zejména tam, kde není možné nebo vhodné provést klasické preemergentní ošetření.

Adjuvanty a aplikační technologie

Pro zvýšení účinnosti herbicidního zásahu a omezení ztrát účinných látek lze využít pomocné prostředky:

- **Spray Aide** (60 ml/100 l vody) - zlepšení smáčivosti, úprava pH, zvýšení kompatibility směsí,
- **Agrovital** (100 ml/150 l vody) - snížení úletu, odparu a zlepšení ulpívání postřiku na rostlinách.

Závěr

Přípravek Successor 600 představuje účinný nástroj herbicidní ochrany řepky olejky, zejména v časných fázích jejího vývoje. V kombinaci s dalšími účinnými látkami a při dodržení správné aplikační technologie umožňuje spolehlivou regulaci plevelů a přispívá ke stabilizaci výnosu porostu.

✂

