

Aspect Pro s Laudisem

Balíček na 13 ha.

**Nová inovovaná herbicidní kombinace
pro postemergentní ošetření kukuřice.**

Účinné látky

flufenacet 200 g/l
terbuthylazine 333 g/l
tembotrione 44 g/l
isoxadifen-ethyl 22 g/l (safener)

Balení

4 × 5 l COEX kanystř Aspect Pro
4 × 5 l HDPE kanystř Laudis

Výhody použití

- výhodná cena ošetření při spo-
lečném nákupu
- vysoká a dlouhodobá účinnost
proti širokému spektru plevelů
v kukuřici
- účinek přes půdu i přes listy
plevelů
- plevelohubný účinek na pře-
rostlé dvouděložné plevely
i jednoděložné trávy
- široké aplikační okno nezávislé
na růstové fázi plevelů i kukuřice

Působení přípravků

Aspect Pro je herbicidní přípra-
vek určený k základnímu ošetření
kukuřice a vyniká dlouhodobým
půdním účinkem, který je důležitý
pro zabezpečení bezplevelného
stavu porostu kukuřice. Přípravek
je možné aplikovat ve směsi s post-
emergentními herbicidy zpravidla
ve fázi 2–6 listů kukuřice a v době,
kdy dvouděložné plevely dosahují
růstové fáze do 5 listů, ježatka kuří
noha je hubena do fáze 1–2 listů.

Laudis dosahuje nejlepší účinnos-
ti při aplikaci na mladé aktivně
rostoucí plevely za podmínek pří-
znivých pro růst plevelů. Trávo-
vité plevely jsou nejcitlivější od 1
do 5 listů před začátkem odnožo-
vání, ježatka kuří noha je hubena
do fáze 2 odnoží. Dvouděložné
plevely jsou nejcitlivější ve fázi
2–6 listů, merlíky, laskavce a rdesna
jsou hubeny i ve vyšších růstových
stádiích.

Návod k použití, dávkování

Dávka vody 200–400 l/ha

Plodina	Plevel	Růstová fáze plevelů	Dávka přípravků
Kukuřice	Ježatka kuří noha	1 list–začátek odnožování	1,5 l/ha Aspect Pro + 1,5 l/ha Laudis Časnější aplikace
	Merlíky, laskavce, rdesna, výdrol řepky a ostatní dvouděložné plevely	2–8 listů	
	Ježatka kuří noha	Začátek odnožování–2 odnože	1,5 l/ha Aspect Pro + 2,0 l/ha Laudis Pozdnější aplikace
	Prosa, béry, rosička	1–5 listů	
	Oves hluchý, výdrol obilnin	2–3 listy	
	Merlíky, laskavce, rdesna	2 listy až 25 cm výška	
	Pcháč oset a ostatní dvouděložné plevely	Do výšky 15–20 cm	



Aspect Pro 1,5 l/ha + Laudis 1,5 l/ha účinek i na přerostlé plevely

Použití herbicidů v kukuřici vzhledem k růstové fázi plevelů

Aspect Pro + Laudis

Dávka 1,5 l/ha + 1,5 l/ha - časně postemergentní aplikace



Ježatka 1. list–začátek odnožování, dvouděložné plevely 2–8 listů, výdrol slunečnice, výdrol řepky, durman, pcháč

Aspect Pro + Laudis

Dávka 1,5 l/ha + 2 l/ha - pozdně postemergentní aplikace



Ježatka začátek odnožování–2 odnože, prosa, béry, rosička 1–5 listů, oves hluchý a výdrol obilovin 2–3 listy, dvouděložné plevely 2–8 listů, výdrol řepky, výdrol slunečnice, rdesna, durman, pcháč